### COVIGIE, un réseau pluriprofessionnel de soignants de premier recours

Créée en avril 2020 dans le cadre de la crise Covid-19 et animée par des organisations de soignants de premier recours (SFMG, SFSPO, CMG, Open Rome)<sup>1</sup>, la plateforme COVIGIE permet aux professionnels de santé (PS) de partager leur expérience et les signaux qui traduisent la réalité du vécu sur le terrain et peuvent aider à la décision. COVIGIE permet aussi de mener des enquêtes express auprès d'un large panel de soignants de premier recours. Les questionnaires, conçus et diffusés aux PS par les membres de COVIGIE, sont relayés par plusieurs autres organisations professionnelles, donnant à COVIGIE une dimension à la fois pluriprofessionnelle et pluristructures.

Mi-avril 2025, les Autorités de Santé ont lancé une nouvelle vague de vaccination Covid-19 dite « de printemps », courant jusqu'au 30 juin. Le constat justifiant cette campagne est simple : la faible circulation hivernale du SARS-CoV-2, le dernier pic épidémique de covid-19 remontant à septembre 2024 et la faible couverture vaccinale au cours de l'hiver 2024/2025 laissent raisonnablement penser que l'immunité de la population a diminué. A ce jour, l'engouement autour des dernières campagnes est resté plus que modéré.

Dans ce contexte, il nous a semblé opportun de mener une enquête sur la perception actuelle du risque Covid-19 et sur l'acceptabilité de la vaccination Covid-19 par les PS et par leurs patients. Elle a été portée par trois des structures partenaires originelles (SFMG, SFSPO, Open Rome) et deux URPS Pharmaciens (en Grand Est et en Auvergne Rhône-Alpes), avec le soutien de Sanofi.

COVIGIE a ainsi interrogé les PS vaccinateurs, entre le 17 juin et le 7 septembre 2025, sur la perception du risque Covid-19 et l'acceptabilité de sa vaccination pour eux-mêmes et pour leurs patients.

### COVIGIE a collecté les réponses de près de 700 PS

Les 685 PS répondants exercent dans toutes les régions françaises. Ce sont majoritairement des médecins généralistes (56%) ou des pharmacien·ne·s (35%). On compte également quelques infirmier·ère·s (4%), des médecins en EHPAD (3%) et des médecins d'autres spécialités (2%). Les principaux résultats sont résumés dans les 4 infographies suivantes.

### **Contacts**

Dr Anne MOSNIER, 06.61.17.36.83, amos@openrome.org

COVIGIE

Une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, des initiatives, des signaux faibles













SFSPO: Société Francophone des Sciences Pharmaceutiques Officinales

**CMG** : Collège de la Médecine Générale

Open Rome: Organize and Promote Epidemiological Networks/Réseaux d'Observation des Maladies et des Epidémies


 $<sup>^{\</sup>mathbf{1}}$  **SFMG** : Société Française de Médecine Générale

## Accès des professionnels de santé à l'information


Enquête Express n°6 : Perception et acceptabilité de la vaccination Covid-19



- 56% de médecins généralistes et 35% de pharmacien·ne·s



Estimez-vous avoir accès aux données scientifiques nécessaires pour établir la balance bénéfices/risques des vaccins Covid-19 disponibles actuellement ? (n = 674)



Par comparaison, lors de l'étude express de mai/juin 2021, 83% des 1 092 PS interrogés répondaient oui/plutôt oui à cette même question.

Estimez-vous avoir accès aux informations organisationnelles nécessaires pour mettre en place cette vaccination selon les recommandations en cours? (n = 640)

Seulement 6 PS sur 10 (62%) estiment accès aux informations pratiques nécessaires pour organiser la vaccination Covid-19.

médecins généralistes sont significativement moins nombreux que les pharmaciens (54% vs 74%) à considérer avoir accès à l'information nécessaire.

A noter que presque tous les pharmaciens (96%) et seulement 24% des MG pratiquent la vaccination Covid-19 dans leur structure.

Quelle(s) principale(s) source(s) d'information utilisez-vous pour suivre l'évolution des recommandations vaccinales contre la Covid-19 ? (3 réponses possibles - n = 681)


La communication des autorités de santé est la principale source d'information pour tous les PS :

- Ministère de la santé/DGS Urgent/Santé publique France (80%)
- Haute Autorité de Santé (33%).

La 3eme source d'information la plus citée diffère selon les soignants : Conseil de l'ordre/syndicats pour 31% des pharmaciens, CMG/Société savante de MG pour 27% des MG.

Dans le même temps, la communication des autorités autour des dernières campagnes de vaccination Covid-19 est jugée peu satisfaisante: 55% des PS ne sont pas (15%) ou plutôt pas (40%) satisfaits.

Estimez-vous avoir les informations nécessaires pour répondre aux questions de vos patients concernant la vaccination Covid-19?



79% des PS (74% des MG et 86% des pharmaciens ; p<0,001) estiment avoir les informations nécessaires pour répondre aux questions de leurs patients.

Ces résultats mettent en avant la nécessité forte d'une amélioration de la communication :

- vers les PS tant en ce qui concerne les aspects scientifiques que les aspects organisationnels,
- urrs la population via les campagnes de promotion de la vaccination Covid-19 par les autorités de santé.



Une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, des initiatives, des signaux faibles











Avec le soutien de




# Connaissance et pratique des professionnels de santé – Focus MG et pharmaciens


Enquête Express n°6: Perception et acceptabilité de la vaccination Covid-19

700 professionnels de santé vaccinateurs de premier recours, de toute la France, ont participé à cette enquête menée à l'été 2025. Compte tenu du petit effectif et de l'hétérogénéité des autres professionnels santé, cette partie ne concerne que les 379 médecins généralistes (MG) et les 239 pharmaciens répondants.

Un PS sur deux (50% des MG et 54% des pharmaciens) considère que la Covid-19 est devenue une infection saisonnière.


Le fardeau de la Covid-19 perçu par les PS reste le plus important pour les personnes âgées (84% des MG et pharmaciens) et les patients immunodéprimés ou atteints de maladies chroniques (80% des MG et pharmaciens).






Quelles sont vos 2 principales raisons pour ne pas faire de recommandation systématique aux personnes ciblées (hormis une infection récente connue ou probable) ? (n = 276 MG et 175 pharmaciens)





Quels sont les patients ciblés les plus faciles à convaincre de l'importance de la vaccination Covid-19? (2 réponses possibles - n = 580)



Les réponses des MG et des pharmaciens mettent en avant 2 leviers pour améliorer la couverture vaccinale des populations ciblées :

- libérer du temps pour motiver les personnes ciblées,
- mieux communiquer vers les professionnels de santé sur la gravité potentielle de la maladie Covid-19.



Une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, des initiatives, des signaux faibles











Avec le soutien de Sanofi

## Acceptabilité de la vaccination Covid-19 par les professionnels de santé


Enquête Express n°6: Perception et acceptabilité de la vaccination Covid-19

Près de 700 professionnels de santé vaccinateurs de premier recours, de toute la France, ont participé à cette enquête menée à l'été 2025 :



- 56% de médecins généralistes et 35% de pharmacien∙ne∙s







Si vacciné Covid-19 en 2024-2025 : si vous aviez eu le choix du vaccin, auriez-vous préféré recevoir (n = 288)


■ ne sais pas ■ Ne souhaite pas répondre

- Un vaccin ARN messager: 52% des PS; 52% des MG; 52% des pharmaciens
- Un vaccin protéique : 2% des PS ; 1% des MG ; 5% des pharmaciens
- Pas de préférence : 46% des PS ; 47% des MG ; 43% des pharmaciens

Les PS vaccinateurs semblent peu s'intéresser à ce jour aux avantages/inconvénients des différentes plateformes vaccinales existantes.

### Si non vacciné Covid-19 en 2024-2025 :

en tant que professionnel de santé, quelles sont les 2 principales raisons de votre non vaccination contre la Covid-19 (hormis une infection récente connue ou probable) ? (n = 363)



La lassitude vis-à-vis des différents rappels et le fait de ne pas se sentir à risque sont les 2 principales raisons de la non vaccination des PS. Le peu de gravité perçue de la maladie, les possibles effets indésirables ou le manque d'efficacité du vaccin viennent ensuite dans la liste des raisons de leur non vaccination Covid-19



Une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, des initiatives, des signaux faibles











Avec le soutien de




# Acceptabilité de la vaccination Covid-19 par les patients - Point de vue des PS

Enquête Express n°6 : Perception et acceptabilité de la vaccination Covid-19

Près de 700 professionnels de santé vaccinateurs de premier recours, de toute la France, ont participé à cette enquête menée à l'été 2025



- 56% de médecins généralistes et 35% de pharmacien∙ne∙s
- 4% d'infirmier-ère-s. 3% de médecins en EHPAD et 2% médecins d'autres spécialités



Selon les PS, les raisons de refus de la vaccination des patients sont, comme pour eux-mêmes, majoritairement la lassitude des vaccins et la non perception de la gravité potentielle de la maladie (Covid pas grave / ne se considère pas à risque).

Vos patients acceptent-ils de recevoir lors de la même visite la co-administration des vaccins contre la grippe et la Covid-19 ? (n = 606)



Pour 88% des PS (85% des médecins généralistes et 94% des pharmaciens), les patients acceptent de recevoir lors de la même visite la co-administration des vaccins contre la grippe et la Covid-19.


Par ailleurs, seulement **15% des PS** indiquent que leurs **patients posent souvent ou parfois des questions sur les technologies de vaccins** Covid-19 existantes autres que ARN messager.

En moyenne, pour un flacon de 6 doses :

- les PS vaccinent 4,7 patients (médiane 5).
- 25% des PS (16% des MG et 33% des pharmaciens) utilisent au mieux la moitié du flacon (1 à 3 doses). L'écart entre les MG et les pharmaciens peut notamment s'expliquer par une organisation pratique différente liée à chaque métier.

Raisons du refus de la co-administration grippe et Covid-19

Pour les PS dont les patients refusent la co-administration : selon vous, pour quelle(s) raison(s) vos patients ont-ils refusé la co-administration Grippe et Covid-19 (2 réponses possibles - n = 71)





Une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, des initiatives, des signaux faibles











Avec le soutien de Sanofi